

Westpaläarktische Conopidae (Insecta: Diptera) in der Sammlung des Museums für Tierkunde der Staatlichen Naturhistorischen Sammlungen Dresden

JENS-HERMANN STUKE¹ & CHRISTIAN KEHLMAIER²

¹ Roter Weg 22, 6789 Leer, Germany. E-Mail: jstuke@zfn.uni-bremen.de

² Staatliche Naturhistorische Sammlungen Dresden, Museum für Tierkunde,
Königsbrücker Landstraße 159, 01109 Dresden, Germany. E-Mail: kehlmaier@web.de

Abstract. West Palaearctic Conopidae (Insecta: Diptera) in the collection of the State Natural Collections Dresden, Museum of Zoology. Records of 595 Palaearctic Conopidae belonging to 44 species from the collection of the Museum für Tierkunde in Dresden (MTKD) are presented. Most of the specimens have been collected in Saxony (26 species), Berlin (16 species) and Saxony-Anhalt (12 species).

Kurzfassung. Nachweise von 595 paläarktischen Conopiden in 44 Arten aus der Sammlung des Museums für Tierkunde in Dresden (MTKD) werden vorgestellt. Die meisten Exemplare stammen aus Sachsen (26 Arten), Berlin (16 Arten) und Sachsen-Anhalt (12 Arten).

Key words. Diptera, Conopidae, faunistics, Palaearctic, Germany, Berlin, Saxony, Saxony-Anhalt.

Einleitung

Die Conopidensammlung des Museums für Tierkunde der Staatlichen Naturhistorischen Sammlungen Dresden (MTKD) wurde revidiert und neu aufgestellt. Als erstes Ergebnis dieser Sammlungsrevision wurde bereits ein Typenkatalog publiziert (STUKE 2004a), der folgende vier Taxa umfasst: *Macroconops helleri* Kröber, 1927 [♂ Holotypus], *Physoconops nigromarginatus* (Kröber, 1915) [♂ Holotypus], *Physoconops ornatifrons* (Kröber, 1915) [♂ Syntypus] und *Stylogaster abdominalis* Kröber, 1914 [♀ Holotypus]. Nunmehr sollen die vorliegenden faunistischen Belege aus der Westpaläarktis dargestellt werden.

Publizierte Daten zur Verbreitung der westpaläarktischen Conopiden sind selten und oft nur schwer zu werten, da die Bestimmungen früherer Autoren den modernen Ansprüchen nicht genügen. Eine Revision von Museumsmaterial ist unerlässlich, um die Verbreitung der Arten zu rekonstruieren. Gerade in Mitteleuropa sind verschiedene Arten stark zurück gegangen, so dass faunistische Nachweise oft nur noch durch Museumsbelege erfolgen können: In Niedersachsen und Bremen sind 38 % der insgesamt 32 nachgewiesenen Arten seit 1956 nicht mehr gefunden worden (STUKE 2003); in Belgien und Luxemburg wurden von 35 nachgewiesenen Arten 11 % nur vor 1949 gesammelt (TOMASOVIC 2000).

Material und Methoden

Das hier präsentierte Material umfasst nur diejenigen Tiere, die bis auf Artniveau determiniert werden konnten. Historische Exemplare mit Fundortangaben wie „Schlesien“ oder „Ungarn“ wurden nicht berücksichtigt, da eine eindeutige Zuordnung der Tiere zu einem Nationalstaat nicht möglich ist. Bei regionalen deutschen Fundorten werden nach Möglichkeit die Koordinaten bei der Materialauflistung hinzugefügt.

Die Nomenklatur entspricht CHVÁLA & SMITH (1988) unter Berücksichtigung der Änderungen durch STUKE (2004b) und STUKE & CLEMENTS (2005). Die Männchen von *Thecophora atra* (Fabricius, 1775) und *Thecophora pusilla* (Meigen, 1824) sowie von *Sicus abdominalis* Kröber, 1915, *Sicus alpinus* Stuke, 2002, *Sicus ferrugineus* (Linnaeus, 1761) und *Sicus fusenensis*

Ôuchi, 1939 sind derzeit nicht zu bestimmen und wurden nicht berücksichtigt. Südeuropäische Tiere aus der *Physocephala vittata*-Artengruppe mit dunkel gefärbtem Thorax werden unter *Physocephala fraterna* (Loew, 1847) geführt, obwohl nicht geklärt ist, ob es sich hierbei um eine eigenständige Art oder nur eine Farbform handelt. Mitteleuropäische Exemplare aus der *Physocephala vittata*-Artengruppe mit mehr oder weniger deutlichem Bestäubungsstreifen auf den Pleuren werden unter *Physocephala vittata* (Fabricius, 1794) geführt, da eine klare Grenze zwischen *Physocephala vittata* und *Physocephala truncata* (Loew, 1847) nicht möglich ist.

Ergebnisse

Insgesamt liegen 595 determinierte und geografisch eindeutig zuordbare Exemplare in 44 Arten vor. Bei drei weiteren Arten der Sammlung – *Myopa tessellatipennis* Motschulsky, 1859 [1♂ 1♀], *Thecophora fulvipes* (Robineau-Desvoidy, 1830) [1♀] und *Thecophora longiventris* Lyneborg, 1962 [1♂] – handelt es sich um unetikettierte bzw. unzureichend etikettierte Exemplare. In Tabelle 1 sind die deutschen Nachweise nach Bundesländern aufgeschlüsselt.

Conopinae

Conops flavicaudus (Bigot, 1880)

Griechenland 1♂, Rhodos.

Conops flavifrons Meigen, 1824

Kroatien 1♂ 1♀, Gebiet um Rijeka, „Litorale“, leg. G. Strobl; **Ungarn** 1♂, Gyón, 10.VII.1898.

Conops flavipes Linnaeus, 1758

Deutschland 1♂, Bayern, Landkreis Mühldorf am Inn, Ramsau [12°13'E 48°10'N]; 1♂, Berlin, Buckow [13°24'E 52°25'N], VI.1905, leg. Schirmer; 1♂, Berlin, Umgebung Berlin; 2♂♂, Berlin, leg. Schirmer; 1♂, Berlin; 1♂, Brandenburg; 1♂ 1♀, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin; 1♂, Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, Harz, 21.VII.1889; 1♂, Nordrhein-Westfalen, Landkreis Neuss, Norf [6°43'E 51°09'N]; 1♂, Nordrhein-Westfalen, Krefeld, 1908, leg. Ulbricht; 1♀, Sachsen; 1♂, Sachsen, Landkreis Bautzen, Lömischau [14°34'E 51°16'N], 6.VIII.1937, leg. Starke; 1♂, Sachsen, Landkreis Bautzen, Umgebung Guttau Lausitz [14°33'E 51°15'N], 21.VII.1982; 2♂♂, Sachsen, Dresden, Umgebung Dresden; 1♂, Sachsen, Dresden, Dresdener Heide, Bühlauer Waldgärten [13°52'E 51°03'N], 28.VII.1985, leg. Bembenek; 1♀, Sachsen, Dresden, leg. Lösche; 1♀, Sachsen, Dresden, Priebnitzgrund, 21.VII.1895; 1♀, Sachsen, Dresden, Umgebung Dresden Waldteiche [13°43'E, 51°08'N], 20.VII.1964, leg. Eck; 1♀, Sachsen, Dresden, Löbnitzgrund [13°39'E 51°07'N], 26.VII.1896; 1♂, Sachsen, Kamenz, Langebrück bei Dresden [13°50'E 51°07'N], 10.VIII.1896; 1♂, Sachsen, Kamenz, Lausnitzer Heide [13°53'E 51°15'N], VIII.1963; 1♂, Sachsen, Landkreis Löbau-Zittau, Großhennersdorf [14°47'E 50°59'N], 25.VI.1911; 1♂, Sachsen, Meißen, Moritzburg [13°40'E 51°09'N]; 1♀, Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Rotstein Lausitz [14°45'E 51°06'N], 19.VII.1919, leg. Starke; 1♀, Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Rotstein Lausitz [14°45'E 51°06'N], 30.VII.1917, leg. Starke; 1♂, Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Muskau [14°43'E 51°32'N], VII.1889; 2♂♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, 27.VI.1897; 1♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, 17.VII.1921; 3♂♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, 2.VIII.1896; 1♂ 1♀, Sachsen, Sächsischer Schweiz, Kl. Berggießhübel [13°57'E 50°52'N], 8.VIII.1925; 2♀, Sachsen, Sächsische Schweiz, Kl. Berggießhübel [13°57'E, 50°52'N], VIII.1911; 5♂♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, Kirnitzschtal zwischen Brückengrund u. Thorw. Brücke [14°14'E 50°56'N], 13.VIII.1970; 1♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, Uttenwald Gr. [14°15'E

Tab. 1: Artnachweise für die einzelnen Bundesländer Deutschlands nach den hier präsentierten Belegen. [B-W – Baden-Württemberg; Bay – Bayern; Ber – Berlin; Bra – Brandenburg; Hes – Hessen; M-V – Mecklenburg-Vorpommern; Nie – Niedersachsen; N-W – Nordrhein-Westfalen; R-P – Rheinland-Pfalz; Sac – Sachsen; S-A – Sachsen-Anhalt; S-H – Schleswig-Holstein; Thü – Thüringen]

	B-W	Bay	Ber	Bra	Hes	M-V	Nie	N-W	R-P	Sac	S-A	S-H	Thü
Conopinae													
<i>Conops flavipes</i>		x	x	x		x		x		x			x
<i>Conops quadrifasciatus</i>			x	x		x				x	x	x	x
<i>Conops scutellatus</i>			x	x						x	x		
<i>Conops strigatus</i>		x								x			
<i>Conops vesicularis</i>		x								x	x		x
<i>Leopoldius brevirostris</i>										x			
<i>Leopoldius coronatus</i>										x			
<i>Physocephala rufipes</i>		x	x							x	x		
<i>Physocephala vittata</i>	x		x							x	x		
Dalmanniinae													
<i>Dalmannia dorsalis</i>										x			
<i>Dalmannia marginata</i>										x			
<i>Dalmannia punctata</i>										x	x		
Myopinae													
<i>Myopa buccata</i>	x		x							x	x		x
<i>Myopa dorsalis</i>			x							x	x		
<i>Myopa fasciata</i>			x							x			x
<i>Myopa occulta</i>										x			
<i>Myopa pellucida</i>			x			x	x			x	x		x
<i>Myopa polystigma</i>										x			
<i>Myopa strandi</i>			x										
<i>Myopa testacea</i>			x		x					x	x		x
<i>Myopa variegata</i>			x										
<i>Myopa vicaria</i>										x			
<i>Sicus abdominalis</i>											x		
<i>Sicus ferrugineus</i>	x		x	x		x	x		x	x	x		x
<i>Sicus nigratarsis</i>						x				x			x
<i>Thecophora atra</i>	x		x	x						x			
<i>Thecophora distincta</i>		x	x	x						x			
<i>Thecophora pusilla</i>	x									x			x
<i>Zodion cinereum</i>			x	x						x			x

50°53'N], 27.VI.1895; 1♂, 1♀, Sachsen, Sächsische Schweiz, Großer Winterberg Süd-Kuppe, 420-490m [14°15'E 50°53'N], 30.VII.1970; 2♂♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, Elbsandsteingebirge, Großer Zschand [14°18'E 50°18'N], 10.VIII.1972, leg. Rietzsch; 1♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, Elbsandsteingebirge, Großer Zschand [14°18'E 50°18'N], 1.VIII.1972, leg. Rietzsch; 1♀, Sachsen, Sächsische Schweiz, Großer Zschand, unterhalb

Zeughaus [14°18'E 50°18'N], 20.VII.1967; 1♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Rabenauer Grund [13°38'E 50°57'N], 24.VI.1894; 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Rabenau [13°38'E 50°57'N], 1.VIII.1970, leg. Nübler; 1♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], 10.VIII.1969, leg. Nübler; 3♂♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], 24.VIII.1919; 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], VIII.1962, leg. Nübler; 2♂♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandter Wald, Edle Krone [13°38'E 50°48'N]; 2♂♂, Sachsen-Anhalt, Magdeburg; 1♀, Thüringen, Landkreis Saale-Holzland-Kreis, Tautenburg [11°42'E 50°59'N], 15.VIII.1909, leg. Schulze; **Georgien** 1♂, Abchasien, Awadschara, Riza See, 1600m, 30.VII.1966, leg. Götz; 1♂, Tabazkuri, 2.VIII.1972; **Österreich** 1♂, Niederösterreich, Manhartsberg [16°09'E 47°59'N], leg. A. Siebeck; 1♂, Tirol, Innsbruck, leg. Thalhammer; **Polen** 1♂, Bydgoszcz (Bromberg), 11.VII.1920, leg. Meyer; 1♂, Szczecin (Stettin); 1♂, Olsztyn, „Minten in Ostpreußen“ [20°49'E 54°10'N], leg. R. Korschefsky; **Rumänien** 1♂, Transsilvania (Siebenbürgen), Râsnov, 14.VII.1895; 1♀, Transsilvania (Siebenbürgen), VIII.1933; **Slowakei** 1♀, Zem. Sirava-Klokocov, 1.VII.1982, leg. H. Rietzsch; 1♀, Vihorlat-Klokocov, VII.1980, leg. H. Rietzsch; **Schweiz** 1♂, Kanton Schwyz, Brunnen, 24.VIII.1900.

Conops insignis Loew, 1848

Griechenland 1♂, Poros; 2♂♂, Peloponnes.

Conops quadrifasciatus De Geer, 1776

Deutschland 4♂♂, Berlin, Umgebung Berlin; 1♂, Berlin, VIII.1903, leg. Schirmer; 1♀, Berlin, 7.IX.1919, leg. Lichtwardt; 1♂, Berlin, Berlin Stadtgebiet, Müggelberge [13°39'E 52°24'N], VIII.1970, leg. Rietzsch; 1♂, Berlin, Buckow [13°24'E 52°25'N], VIII.1908; 1♂, Berlin, Buckow [13°24'E 52°25'N], IX.1907; leg. Schirmer; 2♂♂, Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, Umgebung Berlin Großmachnower Weinberg, [13°30'E 52°16'N], 11.VIII.1918; 1♂, Brandenburg, Landkreis Uckermark, Templin, Lübbesee [13°30'E 53°07'N], 15.VIII.1983; 1♂, Brandenburg, Potsdam [13°02'E 52°24'N]; 1♂ 1♀, Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, Gröden, Heller [13°34'E 51°24'N], 1911, leg. S. Ulrich; 2♂♂ 2♀♀, Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Nordwestmecklenburg, Neukloster [11°14'E 53°52'N], 11.VIII.1971, leg. Rietzsch; 1♂ 1♀, Nordrhein-Westfalen, Krefeld, VIII.1911, leg. Ulbricht; 1♂, Sachsen, Annaberg, Neudorf [12°58'E 50°28'N], 19.VIII.1939, leg. Starke; 1♂, Sachsen, Bautzen, Valtenberg Oberlausitz [14°16'E 51°04'N], 28.VIII.1943, leg. H. Starke; 1♀, Sachsen, Bautzen, Reichenbach [14°48'E 51°08'N], 13.IX.1936, leg. H. Starke; 10♂♂, Sachsen, Dresden, Dresden Umgebung; 18♂♂ 6♀♀, Sachsen, Dresden, Dresden Klotzsche [13°46'E 51°06'N], 21.IX.1962, leg. Förster; 1♂, Sachsen, Dresden, Dresdener Heide bei Bühlau [13°52'E 51°03'N], 15.IX.1972, leg. Nübler; 1♂, Sachsen, Dresden, Dresdener Heide, Bühlauer Waldgärten [13°52'E 51°03'N], 15.IX.1972, leg. Nübler; 1♀, Sachsen, Dresden, Umgebung Dresdener Heide, 5.VIII.1969, leg. Nübler; 2♂♂ 1♀, Sachsen, Kamenz, Lausnitzer Heide [13°53'E 51°15'N], IX.1963; 1♂, Sachsen, Kamenz, Lausnitzer Heide [13°53'E 51°15'N], 5.IX.1969, leg. Nübler; 1♂ 1♀, Sachsen, Landkreis Löbau-Zittau, Neisstal (Neißetal), 26.VII.1920, leg. H. Kramer; 1♂, Sachsen, Landkreis Löbau-Zittau, Umgebung Zittau [14°48'E 50°53'N], 25.VIII.1941, leg. H. Starke; 1♂, Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Muskau [14°43'E 51°32'N], VII.1889; 1♀, Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Rotstein [14°45'E 51°06'N], 13.IX.1936; leg. Starke; 1♂, Sachsen, Sächsischer Schweiz, 2.VIII.1896; 1♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, Kl. Berggießhübel [13°57'E 50°52'N], 21.VIII.1925; 1♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, Hintere Sächsische Schweiz, Großer Winterberg Süd-Kuppe, 420–490m [14°15'E 50°53'N], 30.VII.1970; 1♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, Hintere Sächsische Schweiz, Kirmitzschtal, zwischen Brückengrund u. Thorw. Brücke [14°14'E 50°56'N], 13.VIII.1970; 3♂♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, Hintere Sächsische Schweiz, Vordere Partschenhörner, ca. 450m [14°17'E 50°53'N], 12.VIII.1970; 1♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, Hintere Sächsische Schweiz, Kirmitzschtal, zwischen Brückengrund u. Thorw. Brücke [14°14'E 50°56'N], 29.VIII.1967; 9♂♂, Sachsen,

Vogtland; 1♀, Sachsen, Landkreis Vogtlandkreis, Unteres Osterzgebirge Schwarzbachtal, ca. 400m [12°22'E 50°18'N], VIII.1968, leg. Zirkel; 1♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], 22.VII.1925; 1♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], 29.VII.1969, leg. Nüßler; 1♂ 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], 30.VII.1970, leg. Rietzsch; 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], VIII.1962, leg. Nüßler; 2♂♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], 3.VIII.1913; 1♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], 10.VIII.1969, leg. Nüßler; 2♂♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], 24.VIII.1919; 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], IX.1962, leg. Nüßler; 1♀, Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Zerbst, Walternienburg [11°56'E 51°58'N]; 1♀, Sachsen-Anhalt, Magdeburg; 1♂, Schleswig-Holstein, Landkreis Plön, Plön – Schleswig [10°25'E 54°09'N], VIII.1897; 1♂, Thüringen, leg. Kriehoff; **Österreich** 2♂♂, Salzburg, Ebensee [13°46'E 47°48'N]; 1♂, Tirol, leg. Thalhammer; 1♂, Tirol, Innsbruck; 1♂, Kärnten, Lavanthal, leg. Thalhammer; **Polen** 1♂, Michalowice (Riesengebirge, Kiesewald), IX.1919, leg. A. Schulze; **Schweiz** 1♂, Kanton Graubünden, Chur, 10.VIII.1904, leg. W.Schnuse; **Slovakei** 1♂, Niedere Tatra, Umgebung Stratena 900–1200m, VII.1977, leg. Nüßler; **Tschechien** 1♂, Frantiskovy Lazue (Frenzensbad), 14.VIII.1863, leg. F. Kowarz; 1♀, Frantiskovy Lazue (Frenzensbad), 7.VIII.1903, leg. F. Kowarz; **Ungarn** 1♂, Kalocsa, leg. Thalhammer; 1♂ 1♀, Keczel, leg. Thalhammer; 1♂ 1♀, Hild, leg. Thalhammer.

Conops rufiventris Macquart, 1849

Algerien 1♀, Sidi-bel-Abbes.

Conops scutellatus Meigen, 1804

Deutschland 1♂, Berlin, Müggelberge [13°39'E 52°24'N], VIII. 1970, leg. Rietzsch; 1♂, Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Ortrand [13°45'E 51°22'N], leg. Nüßler; 2♂♂, Sachsen, Bautzen [14°25'E 51°10'N], 15.VII.1941, leg. H. Starke; 1♂, Sachsen, Bautzen [14°25'E 51°10'N], 12.VIII.1942, leg. H. Starke; 1♂, Sachsen, Leipzig, Gun., 8.VIII.1920, leg. A. Schulze; 1♂ 1♀, Sachsen, Dresden, Kaitz [13°43'E 51°00'N], leg. Lösche; 1♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, Berggießhübel [13°57'E 50°52'N], 7.VIII.1898; 1♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, Hintere Sächsische Schweiz, Umgebung Schmilka, Wurzelweg [14°14'E, 50°53'N], 14.VIII.1973; 1♂, Sachsen, Vogtland; 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N]; 1♂, Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Zerbst, Walternienburg [11°56'E 51°58'N], VIII.1897; 1♀, Sachsen-Anhalt, Magdeburg; **Georgien** 1♀, Tbilissi, 800m, 14.-16.VII.1966, leg. Alberti; **Österreich** 9♂♂, Steiermark, Mürzhofen [15°23'E 47°29'N]; leg. Pok; 1♂, Niederösterreich, Rekawinkl, 15.VIII.1887, leg. Pok; 1♂, Wien, 8.VIII.1905; leg. F. Kowarz; 1♂, Gaming; **Tschechien** 1♀, Moravia, Hranice (Mähren, Weisskirchen); **Ungarn** 1♂, Sorokár Fekete, 22.VI.1920.

Conops strigatus Wiedemann, 1824

Deutschland 1♂, Bayern, Landkreis Mühldorf am Inn, Ramsau [12°13'E 48°10'N]; 1♀, Sachsen, Sächsische Schweiz, Elbsandsteingebirge, Großer Zschand [14°18'E 50°18'N], 18.VIII.1972, leg. Nüßler; 1♂, Sachsen, Vogtland; **Österreich** 4♂♂, Steiermark, Mürzhofen [15°23'E 47°29'N], leg. Pok; 1♀, Tirol, VII.1906; **Ungarn** 1♀, Kalocsa, leg. Thalhammer.

Conops vesicularis Linnaeus, 1761

Deutschland 1♂, Bayern, Landkreis Regen, Bayerischer Wald, Rachel [13°23'E 48°58'N], VI.1903, leg. Schulze; 1♂, Sachsen, Annaberg, Fichtelberggebiet Vierenstraße, 850–1000m [12°57'E 50°25'N], VII.1968, leg. Nüßler; 1♂, Sachsen, Landkreis Bautzen, Neschwitz [14°19'E 51°16'N], 9.V.1919; 1♂, Sachsen, Landkreis Bautzen, Czorneboh [14°31'E 51°07'N], 24.VIII.1925, leg. Starke; 1♀, Sachsen, Kamenz, Radeberg [13°55'E 51°07'N], leg. Muhe; 1♀, Sachsen, Dresden, Porsberg [13°52'E, 51°00'N], 16.IV.1959; 1♀, Sachsen, Dresden, Prießnitzgrund, leg. K. Heller; 1♂, Sachsen, Dresden, Heide, 7.V.1895; 3♂♂,

Sachsen, Dresden, Heide; 1♂, Sachsen, Dresden, Heide, leg. Lösche; 1♀, Sachsen, Meißen, Moritzburg [13°40'E 51°09'N]; 1♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, Großer Winterberg, Nord-Seite, Spitzes Horn, 400m [14°17'E 50°54'N], 3.-8.V.1995, leg. U. Kallweit; 1♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, Großer Winterberg, Ost-Seite, 520-540m [14°15'E 50°53'N], 26.V.1968; 1♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, Berggießhübel [13°57'E 50°52'3N], 2.VI.1895; 2♂♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, Berggießhübel [13°57'E 50°52'N], VI.1895; 1♂ 2♀♀, Sachsen, Sächsische Schweiz, Uttenwald Gr. [14°15'E 50°53'N], 9.VI.1895; 1♀, Sachsen, Sächsische Schweiz, Uttenwald Gr. [14°15'E 50°53'N]; 1♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Rabenauer Grund [13°38'E 50°57'N], 29.V.1895; 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Rabenauer Grund [13°38'E, 50°57'N], 23.VI.1912; 1♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], 3.VI.1967, leg. Nüßler; 1♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], 27.IV.1921, leg. W. Baer; 1♀, Sachsen-Anhalt, Halle an der Saale, Dölauer Heide, 1.VI.1969, leg. W. Heese; 1♀, Thüringen, Jena, V.1919, leg. Meyer; **Polen** 1♀, Bialogard (Pommern, Belgard), 1.VI.1940, leg. H. Freude; **Tschechien** 1♂, Moravia, Hranice (Mähren, Weisskirchen); 1♂, Riesengebirge, Pec und Umgebung, 650–900m, VI.1974, leg. Nüßler.

Leopoldius brevirostris (Germar, 1827)

Deutschland 1♂, Sachsen, Dresden, Prießnitzgrund; **Tschechien** 1♀, Moravia, Hranice (Mähren, Weisskirchen).

Leopoldius coronatus (Rondani, 1857)

Deutschland 1♂ 1♀, Sachsen, Sächsische Schweiz, 19.VII.1896; 1♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], VII.1964, leg. Nüßler; 1♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], 15.VII.1917; 1♂ 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], VIII.1962, leg. Nüßler; 1♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Rabenaßu [13°38'E 50°57'N], 1.VIII.1896; 2♂♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Rabenauer Grund [13°38'E 50°57'N], 8.VIII.1898; 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Rabenauer Grund [13°38'E 50°57'N], 15.VIII.1898; 1♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Freital, Umgebung Burgwartsberg [13°38'E 50°59'N], 24.VII.1966, leg. Nüßler; 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt, Hartha [13°32'E 50°58'N]; **Österreich** 1♂, Niederösterreich, Rekawinkl, 27.VII.1887, leg. Pok; 1♂, Niederösterreich, Rekawinkl, 29.VII.1887, leg. Pok; 1♂, Niederösterreich, Rekawinkl, 9.VIII.1887, leg. Pok; 9♂♂, Steiermark, Mürzhofen [15°23'E 47°29'N].

Leopoldius signatus (Wiedemann, 1824)

Schweiz 1♂, Tessin, Centovalli, Pila, 800m, 17.IX.1998, leg. R. Eck; 1♀, Schwyz.

Physocephala chrysorrhoea (Meigen, 1824)

Polen 1♀, Bydgoszcz (Bromberg), 6.VII.1919.

Physocephala fraterna (Loew, 1847)

Griechenland 5♂♂ 3♀♀, Peloponnes; 1♀, Kreta, Rethymnon, 29.IV.1985, leg. Kelm; **Slovakei** 1♀, Sturovo, Kameniza, 10.VII.1980, leg. H. Rietzsch.

Physocephala nigra (De Geer, 1776)

Georgien 1♀, Westkaukasus, Dombai-Ulgen, 1400-2000m, 15.-16.VI.1968, leg. Mücke.

Physocephala rufipes (Fabricius, 1781)

Deutschland 1♂, Bayern, Landkreis Mühldorf am Inn, Ramsau [12°13'E 48°10'N], leg. M. Kirsch; 1♂, Berlin, Umgebung Berlin; 1♀, Berlin, Umgebung Berlin, östlich Rotes Luch, VIII.1971, leg. Rietzsch; 1♂, Berlin, Buckow [13°24'E 52°25'N], VI.1907, leg. Schirmer; 1♂, Berlin, Wannsee [13°10'E 52°25'N], 7.IX.1919; 1♂, Sachsen, Dresden; 2♀♀, Sachsen, Dresden, leg. Lösche; 1♀, Sachsen, Dresden, Pillnitz [13°52'E 51°00'N], leg. Lösche; 1♀, Sachsen, Dresden, Zschieren [13°52'E 50°59'N], 21.VII.1932; 1♂, Sachsen, Umgebung

Dresden; 1♂, Sachsen, Landkreis Muldentalkreis, Wurzen [12°44'E 51°22'N], 28.VII.1901; 1♀, Sachsen, Sächsische Schweiz, 8.VI.1896; 1♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], IX.1962, leg. Nüßler; 1♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt, Leiten [13°38'E 50°48'N], 30.VII.1966, leg. Nüßler; 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Freital, Kesselgrund [13°38'E 50°59'N], 28.VII.1968, leg. Nüßler; 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandter Wald, Seerenbachtal [13°38'E 50°48'N], 1.VIII.1970, leg. Nüßler; 1♀, Sachsen-Anhalt, Dessau, Mosikau, Haideb., VII.1958; **Russland** 1♀, 30 Straßenkilometer südlich von Sotschi, 14.VII.1966, leg. Götz.

Physocephala vittata (Fabricius, 1794)

Deutschland 1♂, Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn, bei Weinsberg, [9°17'E 49°08'N], VIII.1901; 2♀♀, Berlin, Berlin Umgebung, leg. R. Korschefsky; 1♀, Sachsen, Landkreis Bautzen, Lömischau W. L. [14°34'E 51°16'N], 24.VII.1956; 1♀, Sachsen, Dresden, leg. Lösche; 1♂, Sachsen, Pestitz, leg. Lösche; 1♂, Sachsen-Anhalt, Magdeburg, leg. W. Schnuse; 1♂, Sachsen-Anhalt, Anhalt, leg. W. Schnuse; 1♀, Sachsen-Anhalt, Anhalt, 1896, leg. W. Schnuse; 1♂, Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, Kleinzerbst [12°46'E 51°44'], VI.1904, leg. W. Schnuse; **Griechenland** 1♂, Peloponnes.

Dalmanniinae

Dalmannia aculeata (Linnaeus, 1761)

Russland 1♂ 1♀, Westkaukasus, Umgebung Teberda, 1400-1600m, 12.-14.VI.1968, leg. Mucho.

Dalmannia dorsalis (Fabricius, 1794)

Deutschland 1♂, Sachsen, leg. M. Kirsch; **Italien** 1♂, Sardegn, Cagliari, 6.-9.IV.1933; **Marokko** 2♂♂, Fès, 29.-30.III.1932, leg. R. Meyer.

Dalmannia marginata (Meigen, 1824)

Deutschland 1♂, Sachsen, Dresden, Plaunscher Grund, leg. M. Kirsch.

Dalmannia punctata (Fabricius, 1794)

Deutschland 1♀, Sachsen, Bautzen, Abgott [14°25'E 51°10'N], 3.VI.1919; 1♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], 15.V.1913; 1♂, Sachsen-Anhalt, Anhalt, leg. W. Schnuse; **Österreich** 1♂, Eichkogel, 26.V.1889.

Myopinae

Melanosoma bicolor (Meigen, 1824)

Italien 1♂ 1♀, Postumia, VII.1934, leg. R. Meyer; **Kroatien** 1♂, Krk, Malinska, VII.1934, leg. R. Meyer; **Ungarn** 3♂♂ 3♀♀, Budapest; 1♀, Balaton, Tihany, VII.1966, leg. Fritzsche.

Myopa buccata (Linnaeus, 1758)

Deutschland 1♂, Baden-Württemberg, Bad Schussenried, 26.V.1892; 1♂, Berlin, Buckow [13°24'E 52°25'N], leg. Schirmer; 1♀, Berlin, Buckow [13°24'E 52°25'N], V.1920, leg. Schirmer; 1♂ 3♀♀, Berlin, Umgebung Berlin; 1♀, Sachsen, Annaberg-Buchholz, Hermannsdorfer Wiesen bei Geyer, ca. 700m [12°55'E 50°35'N], V.1967, leg. Nüßler; 1♀, Sachsen, Annaberg-Buchholz, Umgebung Geyer, Hermannsdorfer Wiesen [12°55'E 50°35'N], 13.VI.1966, leg. Nüßler; 1♀, Sachsen, Annaberg-Buchholz, Hermannsdorfer Wiesen bei Geyer, ca. 700m [12°55'E 50°35'N], 28.VI.1967, leg. Nüßler; 1♀, Sachsen, Aue-

Schwarzenberg, Lössnitz [12°44'E 50°37'N], 13.V.1920; 1♂, Sachsen, Bautzen [14°25'E 51°10'N], V.1951, leg. H. Starke; 1♂, Sachsen, Landkreis Bautzen, Teichnitz [14°25'E 51°11'N], 30.V.1936, leg. H. Starke; 1♂, Sachsen, Umgebung Dresden; 1♂, Sachsen, Umgebung Dresden, Saubachtal, 17.VI.1972, leg. Rietzsch; 1♂, Sachsen, Dresden, Dresdener Heide, 7.V.1899, leg. H. Koksck; 1♂, Sachsen, Dresden, Dresdener Heide, 13.V.1901; 1♂, Sachsen, Dresden, Großer Garten, 6.V.1894; 1♀, Sachsen, Dresden, Loschwitz [13°49'E 51°03'N], 15.IV.1894; 1♀, Sachsen, Dresden, Dresdener Heide, 5.V.1935, leg. H. Koksck; 1♀, Sachsen, Dresden, Dresden Stadtgebiet, Luga, 30.V.1965; 1♂, Sachsen, Erzgebirge, 31.V.1898, leg. W. Schnuse; 2♀, Sachsen, Kamenz, Langebrück [13°50'E 51°07'N], 5.V.1907; 1♂, Sachsen, Kamenz, Radeberg [13°55'E 51°07'N], leg. Muche; 1♂, Sachsen, Landkreis Löbau-Zittau, Zittau [14°48'E 50°53'N], 15.V.1910, leg. H. Starke; 1♂, Sachsen, Leipzig, Gr.-St., 16.V.1921, leg. A. Schulze; 1♂, Sachsen, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Niesky [14°49'E 51°17'N], 17.IV.1902; 1♂, Sachsen, Oberlausitz, 14.V.1949, leg. H. Starke; 3♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, Elbtal; 1♀, Sachsen, Sächsische Schweiz, 16.V.1894, leg. W. Schnuse; 1♂, Sachsen, Sächsische Schweiz, Umgebung Wehlen, Wiese oberhalb Hankebruch [14°02'E 50°57'N], 28.V.1980; 3♂♂, Sachsen, Vogtland; 1♂, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], 4.VI.1925; 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], 22.V.1909; 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N], 29.V.1909; 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandt [13°38'E 50°48'N]; 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Rabenauer Grund [13°38'E 50°57'N], 26.V.1926; 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Rabenauer Grund [13°38'E 50°57'N], 14.VI.1914; 1♂, Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Zerbst, Walternienburg [11°56'E 51°58'N], 22.IV.1895, W. Schnuse; 2♂♂, Thüringen, Jena, 1920, leg. Friese; **Polen** 1♂, Bydgoszcz (Bromberg), 17.IV.1920, leg. Meyer; 3♀, Olsztyn, „Minten in Ostpreußen“, leg. R. Korschefsky; **Schweiz** 1♀, Lugano, V.1905, leg. W. Schnuse; **Slovakei** 2♀, Kovacovske Kopce, V.1978, leg. Rietzsch; **Tschechien** 1♀, Moravia, Hranice (Mähren, Weisskirchen); 1♀, Riesengebirge, Pec und Umgebung, 650–900m, VI.1974, leg. Nüßler.

Myopa dorsalis Fabricius, 1794

Deutschland 1♀, Berlin, F. Kowarz; 1♂, Sachsen, Dresden, Umgebung Dresden; 1♂, Sachsen-Anhalt, Anhalt, leg. W. Schnuse; **Griechenland** 1♂, Morea, Umgebung Olympia, IV.-V., leg. Muche; **Türkei** 1♂, Anatolia, Adana-Geyhan, V., leg. Muche; 1♂, Anatolia, Alem-D. Polonez, VI., leg. Muche; 1♂, Anatolia, Eregli, IV., leg. Muche.

Myopa fasciata Meigen, 1804

Deutschland 1♀, Berlin, Buckow [13°24'E 52°25'N], leg. Schirmer; 1♂, Sachsen, Aue-Schwarzenberg, Lössnitz [12°44'E 50°37'N], leg. Römer; 2♂♂, Sachsen, Dresden, Elbtal; 1♀, Sachsen, Lömisch, 19.VIII.1910, leg. Starke; 1♂, Sachsen, Lömisch, 30.VIII.1909, leg. Starke; 1♀, Thüringen, Jena, 1920, leg. Friese; **Polen** 1♂, Bydgoszcz (Bromberg), leg. Meyer.

Myopa occulta Wiedemann, 1824

Deutschland 1♂, Sachsen, Leipzig, Grts., 21.VII.1909, leg. Schulze.

Myopa pellucida Robineau-Desvoidy, 1830

Deutschland 1♂, Berlin, 28.IV.1889; 1♂, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin; 1♂, Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, Harz, leg. Letzner; 1♀, Niedersachsen, Braunschweig; 1♂, Sachsen, Oberlausitz, VI.1959, H. Starke; 1♂, Sachsen, Landkreis Bautzen, Niedergurig [14°16'E 51°21'N], 2.VI.1941, leg. H. Starke; 1♂, Sachsen, Dresden, Dresdener Heide, 2.VI.1899, leg. H. Koksck; 1♂, Sachsen, Bautzen [14°25'E 51°10'N], 10.VI.1911; 1♀, Sachsen, Landkreis Bautzen, Lömischau [14°34'E 51°16'N], 12.VI.1955, leg. Jordan; 1♀, Sachsen, Dresden, Elbtal; 1♂, Sachsen-Anhalt, Anhalt, leg. W. Schnuse; 7♂♂, Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Zerbst, Walternienburg [11°56'E 51°58'N], 22.IV.1895, leg. W. Schnuse; 2♂♂, Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Zerbst, Walternienburg [11°56'E 51°58'N], 4.IV., leg. W. Schnuse; 1♂, Thüringen, Gotha, Galberg bei Gotha, 7.V.1909, leg. Janner; 1♀,

Thüringen, Gotha; **Frankreich** 1♂, Korsika, Bonifacio, 21.IV.1900, leg. W. Schnuse; 1♂, Korsika, Bonifacio, 15.IV.1900, leg. W. Schnuse; **Italien** 1♂, Sardegn, Nuoro, 15.-17.IV.1933, leg. R. Meyer; 3♂♂ 2♀♀, Sardegn, Villacidro, 10.-12.IV.1933, leg. R. Meyer; **Kroatien** 1♂, Gebiet um Rijeka, „Litorale“, leg. G. Strobl; **Slowakei** 1♀, Piestany (Pöstyén), 9.VI.1902, leg. Lichtwardt; **Tschechien** 1♂, Moravia, Hranice (Mähren, Weisskirchen); **Ungarn** 1♀, Pestszentimre, 1932, leg. E. Horváth; 1♂, Üllő, 1932, leg. E. Horváth.

Myopa palliceps (Bigot, 1887)

Algerien 1♂, Biskra, III.1931, leg. R. Meyer; **Tunesien** 1♀, Tunis, IV.1930, leg. R. Meyer.

Myopa picta Panzer, [1798]

Slowakei 1♀, Kovacovske Kopce, V.1978, leg. Rietzsch; **Türkei** 1♂, Konia.

Myopa polystigma Rondani, 1857

Deutschland 1♂, Sachsen, Leipzig, Connewitz, 1.V.1913, leg. A. Schulze; 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Freital, Burgwartsberg [13°38'E 50°59'N], V.1980, leg. Nüßler.

Myopa strandi Duda, 1940

Deutschland 1♀, Berlin, Lichtenrade [13°25'E 52°23'N], 10.V.1908, leg. H. Wadzeck.

Myopa testacea (Linnaeus, 1767)

Deutschland 1♂, Berlin, Umgebung Berlin; 1♀, Berlin, Weinberg, leg. Schirmer; 1♂, Hessen, Darmstadt, 3.V.1933, leg. R. Meyer; 1♂, Sachsen, Chemnitzer Land, Meerane [12°27'E 50°50'N], 12.IV.1981, leg. Zenker; 2♀♀, Sachsen, Chemnitzer Land, Meerane [12°27'E 50°50'N], 16.IV.1981, leg. Zenker; 1♂ 1♀, Sachsen-Anhalt, Magdeburg; 1♂, Thüringen, Jena, 1920, leg. Friese; **Ukraine** 1♀, Krim; **Ungarn** 3♂♂ 1♀, Pestszentimre, 1932, leg. E. Horváth; 2♂♂ 1♀, Budapest, 1932, leg. E. Horváth.

Myopa variegata Meigen, 1804

Deutschland 1♀, Berlin, Berlin Umgebung, leg. R. Korschefsky; 1♀, Berlin, Buckow [13°24'E 52°25'N], leg. Schirmer.

Myopa vicaria Walker, 1849

Deutschland 1♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Rabenauer Grund [13°38'E 50°57'N].

Sicus abdominalis Kröber, 1915

Deutschland 1♀, Sachsen-Anhalt, Magdeburg.

Sicus caucasicus Zimina, 1963

Russland 1♀, Westkaukasus, nahe Teberda, Dzhemagattal, 1600-1800m, 23.VI.1968, leg. Mucbe.

Sicus ferrugineus (Linnaeus, 1761)

Deutschland 1♀, Baden-Württemberg, Fildern, 8.VIII.1915; 1♀, Baden-Württemberg, Landkreis Emmendingen, Emmendingen Stadtgebiet, Bückle, [7°50'E 48°07'N], VII.1983, leg. Nüßler; 1♀, Berlin, Umgebung Berlin; 1♀, Berlin, Finkenkrug, leg. R. Korschefsky; 1♀, Brandenburg, Landkreis Havelland, nördlich Falkenhagen [13°06'E 52°34'N], 19.VII.1972, leg. Fiedler; 1♀, Brandenburg, Landkreis Uckermark, Umgebung Gollin [13°36'E 53°30'N], VIII.1965, leg. Rothe; 1♀, Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Ostvorpommern, Trassenheide [13°51'E 54°05'N], 22.IV.1900, leg. H. Wadzeck; 1♀, Niedersachsen, Landkreis Göttingen, Duderstadt [10°15'E 51°30'N], VII.1893; 1♀, Rheinland-Pfalz; 4♀♀, Sachsen, Vogtland; 1♀, Sachsen, Bautzen [14°25'E 51°10'N], 15.VII.1941, leg. H. Starke; 1♀, Sachsen, Dresden [13°E 51°03'N] (Dresden); 1♀, Sachsen, Dresden, Plaunischer Grund (Heidenschanze), VII.1970,

leg. Rietzsch; 1 ♀, Sachsen, Dresden, Botanischer Garten, 25.VI.1971, R. Eck; 1 ♀, Sachsen, Kamenz, Lausnitzer Heide [13°53'E 51°15'N], 8.VII.1964; 1 ♀, Sachsen, Meißen, Elbtal bei Meißen [13°28'E 51°09'N], 18.VIII.1965, leg. R. Eck; 1 ♀, Sachsen, Meißen, Moritzburg [13°40'E 51°09'N], VII.1960; 1 ♀, Sachsen, Sächsische Schweiz, 14.VI.1896, leg. W. Schnuse; 1 ♀, Sachsen, Sächsische Schweiz, Elbsandsteingebirge, Großer Zschand [14°18'E 50°18'N], 10.VIII.1972, leg. Rietzsch; 1 ♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Falkenhain [13°44'E 50°48'N], 16.VIII.1919, leg. G. Kretzschmar; 1 ♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Umgebung Bärenstein [13°47'E 50°48'N], VII.1972, leg. H. Rietzsch; 1 ♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Tharandter Wald, Seerenbachtal [13°38'E 50°48'N], 11.VII.1970, leg. Nüßler; 1 ♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Umgebung Geising [13°47'E 50°45'N], 3.VII.1977; 1 ♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Geisingberg [13°47'E 50°45'N], 26.VII., leg. Nüßler; 1 ♀, Sachsen, Weißeritzkreis, Unteres Osterzgebirge, Lehmühle [13°35'E 50°49'N], 31.VII.1970, leg. Rietzsch; 1 ♀, Sachsen-Anhalt, Kl. Zerbst, VI.1904, leg. W. Schnuse; 1 ♀, Thüringen, Landkreis Kyffhäuserkreis, Kyffhäuser, Gipshänge Umgebung Ochsenburg [11°06'E 51°21'N], 1973, leg. Rietzsch; 2 ♀♀, Thüringen, Landkreis Saale-Holzland-Kreis, Tautenburg [11°42'E 50°59'N], VI.1974, leg. Rietzsch; **Frankreich** 1 ♀, Korsika; **Italien** 1 ♀, Dolomiten, Rienzthal; **Österreich** 1 ♀, Tirol; **Polen** 1 ♀, Darlowo (Rügenwalde), 2.VIII.1904, leg. M.P. Riedel; **Slovakei** 1 ♀, Vihorlat-Klokocov, VIII.1980, leg. H. Rietzsch; 1 ♀, Zem. Sirava-Klokocov, 1.VII.1982, leg. H. Rietzsch; 2 ♀♀, Niedere Tatra, Umgebung Stratena, 900-1200m, VII.1977, leg. Nüßler; **Usbekistan** 1 ♀, Margelan.

Sicus nigritarsis Zimina, 1975

Deutschland 1 ♂, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 1916, leg. Friese; 1 ♂, Sachsen, Dresden, Elbtal; 2 ♀♀, Thüringen, Jena, 1920, leg. Friese.

Thecophora atra (Fabricius, 1775)

Deutschland 1 ♀, Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn, Dornbach, [9°10'E 49°18'N], 31.VIII.1913; 1 ♀, Berlin, Buckow [13°24'E 52°25'N], leg. Schirmer; 1 ♀, Brandenburg, Frankfurt an der Oder, 2.IX.1919, leg. M.P. Riedel; 1 ♀, Sachsen, Bautzen [14°25'E 51°10'N], 30.VIII.1941. leg. H. Starke; 1 ♀, Sachsen, Dresden, Elbtal; 1 ♀, Sachsen, Leipzig, Dob., 17.VI.1920, leg. A. Schulze; **Griechenland** 1 ♀, Kreta; **Italien** 1 ♀, Trieste, Opicina, VII.1934, leg. Meyer; 3 ♀♀, Postumia, VII.1934, leg. Meyer; **Schweiz** 1 ♀, Kanton Waadt, Vevey, 18.VIII.1900, leg. W. Schnuse; **Ungarn** 1 ♀, Keczel, leg. Thalhammer.

Thecophora distincta (Wiedemann, 1824)

Deutschland 1 ♂, Bayern, Egertal, 28.VII.1905, leg. F. Kowarz; 1 ♀, Berlin, Buckow [13°24'E 52°25'N], leg. Schirmer; 1 ♀, Brandenburg, Frankfurt an der Oder, 17.VI.1929, leg. M.P. Riedel; 1 ♀, Sachsen, Dresden, leg. Lösche; **Ungarn** 1 ♂, Keczel, leg. Thalhammer; 1 ♂, Plattensee, Sz György Berg bei Tapolca, 9.VII.1964, leg. Götz.

Thecophora melanopa Rondani, 1857

Ungarn 2 ♀, Budapest.

Thecophora pusilla (Meigen, 1824)

Deutschland 1 ♀, Baden-Württemberg, Landkreis Heilbronn, Dornbach [9°10'E 49°18'N], IX.1907, leg. F. Kowarz; 1 ♀, Sachsen, leg. M. Kirsch; 1 ♀, Sachsen, Bautzen [14°25'E 51°10'N], 6.VII.1933, leg. Starke; 1 ♀, Sachsen, Bautzen [14°25'E 51°10'N], 22.VII.1933, leg. Starke; 1 ♀, Thüringen, Jena [11°35'E 50°55'N], 27.VI.1919, leg. R. Meyer; **Kroatien** 2 ♀♀, Krk, Malinska, VII.1934, leg. Meyer; 2 ♀♀, Fuzine Sav. ban. S.H.S., VII.1934, leg. Meyer; **Schweiz** 1 ♀, Schwyz; **Ungarn** 1 ♀, Budapest; 1 ♀, Gyón, 10.VII.1898.

Zodion cinereum (Fabricius, 1794)

Bulgarien 1 ♀, Karst bei Nova Zagora, 22.VII.1965, leg. Götz; **Deutschland** 1 ♂, Berlin, Umgebung Berlin; 1 ♂, Berlin, Buckow [13°24'E 52°25'N], VII.1912; 1 ♂, Brandenburg,

Frankfurt an der Oder [14°32'E 52°20'N], 4.VII.1917, leg. M.P. Riedel; 1♀, Sachsen, Bautzen [14°25'E 51°10'N], 6.VII.1933, leg. H. Starke; 1♂, Sachsen, Landkreis Bautzen, Gutttau [14°33'E 51°15'N], 13.VII.1921, leg. H. Starke; 1♀, Thüringen, leg. Kriehoff; 1♀, Thüringen, Landkreis Saale-Orla-Kreis, Pössneck [11°36'E 50°41'N], 21.VI.1906, leg. Riedel; **Griechenland** 1♂, b. Athen v.O.; 1♂, Kreta u. O.; **Kroatien** 3♂♂ 4♀♀, Krk, Malinska, VII.1934, leg. Meyer; **Ungarn** 3♂♂ 2♀♀, Budapest; 1♀, Erdöbénye, leg. Rosanowski.

Zodion erythrurum Rondani, 1865

Algerien 1♂, Biskra, III.1931, leg. R. Meyer; **Serbien** 1♀, Serbien, Hlf. Nis; 1♂, Serbien, Hlf. Pozarevac; **Tunesien** 7♂♂, Tunis, 6.-28.IV.1927, leg. R. Meyer.

Danksagung

Unser Dank gilt Frau Monika Oertel (Dresden) für die sorgfältige Übertragung der Funddaten und für das Heraussuchen der geografischen Koordinaten. Uwe Kallweit (Dresden) ermöglichte die Bearbeitung und half beim Transport der Conopidensammlung. Hans-Joachim Flügel (Knüllwald) sah das Manuskript kritisch durch.

Literatur

- CHVÁLA, M. & SMITH, K.G.V. (1988): Conopidae. – in SÓOS, A. & PAPP, L. (eds.): Catalogue of Palearctic Diptera. Volume 8. 363pp.; Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo: Elsevier.
- STUKE, J.-H. (2003): Die Blasenkopffliegen (Diptera: Conopidae) Niedersachsens und Bremens. – *Drosera* 2003: 81–94; Oldenburg.
- STUKE, J.-H. (2004a): Typenkatalog der Conopiden (Diptera) des Staatlichen Museums für Tierkunde in Dresden. – *Studia dipterologica* 11: 7–8; Halle.
- STUKE, J.-H. (2004b): Anmerkungen zu den von P. Gabriel Strobl beschriebenen Conopidae (Diptera). – *Studia dipterologica* 10: 704–706; Halle.
- STUKE, J.-H. & CLEMENTS, D. (2005): The interpretation of some Conopidae (Diptera) described by Robineau-Desvoidy. – *Zootaxa* 886: 1–12.
- TOMASOVIC, G. (1938): Conopidae (Diptera Brachycera) de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. – *Bulletin et annales de la société royale d'entomologie de Belgique* 136: 91–123; Brüssel.

Bei der Redaktion eingegangen am 17.VI.2005, zum Druck angenommen am 26.V.2006.